

Proveedor de rendimiento ☐ Dr. Jay Kamath ☐ Dr. Rafael Fleites
Fecha del examen: _____
Hora de llegada: _____
(SU TIEMPO PUEDE CAMBIAR POR CONSIGUIENTE)

GOLYTELY INSTRUCCIONES PARA TU COLONOSCOPIA

Por favor, espere estar en el centro por NO MENOS de 3 horas.

Su procedimiento ha sido programado en:

☐ Bay Area Endoscopy Center 5771 49th St. N St. Petersburg, FL 33709 727-528-2261	☐ Northside Hospital 6000 49 th St. N St. Petersburg, FL 33709 727-521-5158	☐ St Pete General 6500 38 TH Ave. N St. Petersburg FL 33710 727-384-1414
---	--	---

Para garantizar un examen exitoso, siga todas las instrucciones cuidadosamente.

PUEDE tomar los medicamentos de la mañana como de costumbre (que incluye presión arterial, colesterol, depresión, ansiedad, medicamentos para las convulsiones, medicamentos para la tiroides, etc.)
(NO tome NSAIDS o anticoagulantes)

Recuerde, su procedimiento SERÁ reprogramado si:

- ✓ No sigue TODAS las instrucciones de preparación.
- ✓ No completa su preparación según las instrucciones
- ✓ No tiene a nadie para llevarlo a su casa (si planea tomar el BUS o UBER, debe tener una parte responsable para que lo acompañe)

☐ Estamos solicitando la autorización de su especialista. NO debes suspender ningún medicamento sin autorización.
Nos comunicaremos con usted con instrucciones de cuándo dejar de tomar cualquier medicamento

7 DÍAS ANTES DE TU PROCEDIMIENTO

DEJE de tomar cualquier suplemento / medicamento que contenga hierro.
NSAIDS, Ibuprofeno, Advil, Aleve, Motrin, Celebrex, Naproxeno, Aceite de pescado y Vitamina E.

(Si toma Aspirin 81 mg, puede continuar tomándolo)
NO COMA NINGUNA SEMILLA DE NUECES O POPCORN!

ADQUIERA ESTOS ARTÍCULOS ANTES DEL TIEMPO:

Golytely solución (Mandaremos una receta a la farmacia)

Turn Over



INSTRUCCIONES PARA SU PROCEDIMIENTO

2 DIAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

3:00 pm

Tomar ambas tabletas de Dulcolax (proporcionadas por la oficina)

EL DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

Al despertar:

- ❖ Comience una dieta líquida clara
- NO ROJO O PÚRPURA

Puede tener:

- ✓ Café o té (NO leche o crema)
- ✓ Jugo sin pulpa (manzana, uva blanca)
- ✓ Caldo o caldo
- ✓ Kool-Aid o Crystal Light
- ✓ Jell-O (NO fruta o coberturas añadidas)
- ✓ Paletas heladas o hielo italiano
- ✓ Bebidas carbonatadas (Coca, Pepsi, Sprite, Dieta o Regular)

4pm

Comience a beber 8 oz de la solución cada 10-15 minutos. ¡Usted puede esperar tener diarrea, debe continuar bebiendo toda la preparación! Esto tomará aproximadamente 4 horas en completarse. NO tome nada para detener la diarrea.

- ✓ DIABÉTICOS EN LA INSULINA: solo tome MEDIA su dosis matutina de insulina. Si usa insulina de acción prolongada, NO tome su dosis nocturna.



**NADA QUE COMER O BEBER DESPUES DE LA
MEDIANOCHE.**



**NADA QUE COMER O BEBER
DESPUES DE LA MEDIANOCHE.**

El día de su procedimiento

Usted puede tomarse los medicamentos usuales como para la presión arterial, colesterol, ansiedad o depresión, convulsiones, y tiroides. **SOLAMENTE CON UN POQUITO DE AGUA.**

DIABETICOS

Si usted es DIABÉTICO, y su diabetes no está controlada por favor **TOMAR** los medicamentos para su diabetes.

Pero si su diabetes está bajo control entonces **NO tome** ningún medicamento oral para la diabetes o insulina

Recuerde de mantenerse chequeando su nivel de Glucosa todo el tiempo en el que se esté preparando para el procedimiento

**Si tiene alguna pregunta, no dude en
llamar
727-273-2907 Yairis**

